



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

## Nákaza *Burkholderia cepacia* u pacientů JIP v Německu

Počínaje červencem 2008 byl ve dvou německých nemocnicích na severu země detekován výskyt nozokomiální nákazy *Burkholderia cepacia* u 34 pacientů jednotek intenzivní péče, z nichž u pěti došlo na základě této infekce k rozvoji pneumonie.

Epidemiologické šetření prokázalo kontaminaci *Burkholderia cepacia* na nesterilních rukavicích pro mokré umývání pacientů (Innovate GmbH, AM Care washing gloves fast&fresh, šarže 0816302 a 0821803), exportované francouzským distributorem. Je pravděpodobné, že pacienti byli nákaze exponováni během mytí, při kterém personál používal výše uvedené rukavice.

Ve zprávě je upozorněno na to, že mytí imunitně oslabených pacientů v nesterilních rukavicích není obecně doporučováno.

Příslušné informace budou zaslány také do systému Rapid Alert System for Non-Food Products (RAPEX).

V současné době nejsou žádné signály o tom, že by mohly být postiženy i jiné země než Německo a Francie.

*(Zpracováno podle zprávy RKI z 16.10. 2008)*

Dodatek:

### **Burkholderia cepacia**

- Méně běžný druh
- Aerobní gramnegativní tyčka
- Podmíněný patogen
- Původce nozokomiálních nákaz (transplantace, urogenitální trakt)
- Vysoká rezistence vůči některým dezinfekčním prostředkům
- Obtížné léčitelné - rezistence na antibiotika

MUDr. Kateřina Fabiánová