


Situace v Evropě:

Celá západní Evropa je stále v plošné epidemii, některé země však už hlásí jasný ústup nemocnosti (Francie, Slovensko, částečně Anglie). Dominance chřipky B přetrvává, ale počet případů chřipkou B v Evropě již třetí týden po sobě klesá, počty pacientů s chřipkou A spíše stagnují – nijak výrazně neklesají ani nestoupají. Každopádně je zřejmé, že epidemická vlna v Evropě ustupuje velmi zvolna.

Situace v ČR:

Dominujícím patogenem je stále chřipka B/Yamagata, cirkulace chřipky A/H1N1 stoupla na 10 % (viz graf). Poměr nechřipkových agens se příliš nemění - jejich výskyt je v současné době stále na velmi nízké úrovni.

Zcela minimální je letos cirkulace chřipky A/H3N2, u ambulantních pacientů se téměř nevyskytuje, u hospitalizovaných o něco málo více (odhadujeme cca 2 %), ale i tak lze konstatovat, že letošní výskyt chřipky A/H3N2 v ČR je minimální.



V 11. kalendářním týdnu je **nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1 693 nemocných na 100 000 obyvatel**, což při porovnání s minulým týdnem představuje pokles o 12 %. Nejvyšší nemocnost je aktuálně evidována v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a Libereckém kraji, kde počty nemocných stále ještě přesahují hodnotu 2 000/100 000. Nemocnost klesá ve všech věkových skupinách i ve všech krajích.

V kategorii ILI, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byť výrazně podhodnocuje skutečnou nemocnost chřipkou, je v aktuálním týdnu hlášeno 270 nemocných na 100 000 obyvatel, což v porovnání s minulým týdnem představuje pokles nemocnosti o necelých 21 %. Nemocnost klesá ve všech věkových skupinách a ve většině krajů, 3 kraje však hlásí vzestup počtu nemocných.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 16. 3. 2018 hlášeno celkem **483 klinicky závažných případů chřipky** vyžadujících intenzivní péči, z nichž ve **147 případech došlo k úmrtí** (115 pacientů ve věkové skupině 60+, 25 pacientů ve věkové skupině 25-59 let, 4 pacienti ve věku 15-24 let, 2 pacienti ve věku

6-14 let, 1 pacient ve věku 0-5 let). Z uvedeného počtu nemocných se jednalo ve 222 případech o ženy a ve 261 případech o muže.

Závěr: ČR je nadále ve fázi plošné epidemie, ale stejně jako jinde v Evropě již počet pacientů s chřipkou klesá. Etiologie chřipkových infekcí je dosud smíšená, laboratorně jsou diagnostikovány oba typy chřipkového viru, typ B jednoznačně převažuje u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. U typu A jasně převažuje subtyp A/H1N1.

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ

MUDr. Jan Kynčl, odd. epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ