


Situace v Evropě:


Záchytnost chřipkových virů z celkového počtu testovaných materiálů se nyní v Evropě jako celku pohybuje na hodnotě cca 11%, což je oproti minulému KT pokles o 1 %.




zdroj: www.ecdc.europa.eu

Situace v ČR:

Incidence laboratorně prokázaných chřipkových infekcí v ČR nadále klesá, nicméně sporadické záchyty jsou stále evidovány. Z nechřipkových virů se během několika posledních KT zvýšila incidence především u RSV a hCoV. V současné době již nepředpokládáme výraznou změnu uvedených poměrů, lze počítat ještě s určitým nárůstem nechřipkových virů.



V aktuální chřipkové sezoně bylo do 4. 5. 2018 hlášeno celkem **655 klinicky závažných případů chřipky** vyžadujících intenzivní péči, ve **251 případech došlo k úmrtí**. Ve skupině letálních případů byl u 51 pacientů diagnostikován virus chřipky A/H1, v 7 případech A/H3 a u 38 pacientů byla stanovena pouze chřipka A bez dourčení subtypu. Chřipka B typu byla stanovena ve 123 případech, v 1 případě pak B/Victoria a ve 30 případech B/Yamagata. U jednoho pacienta nebylo etiologické agens objasněno.



MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ
MUDr. Jan Kynčl, odd. infekční epidemiologie, SZÚ