


Situace v Evropě:

Celá západní Evropa je stále v plošné epidemii, nemocnost klesá mírně, v některých státech kolísá a spíše stagnuje na pomyslných vrcholech. U našich bezprostředních sousedů (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko) je stále plošná epidemie. Ve většině evropských států dominuje chřipka B, chřipka A spíše v různé míře ko-cirkuluje, vyskytují se oba subtypy (A/H1N1 i A/H3N2). Míra zastoupení chřipky B versus chřipka A se mezi jednotlivými evropskými státy liší.

Situace v ČR:

V kohortě 450 sentinelových pacientů vyšetřených od počátku epidemické sezóny (40. KT 2017) v současné době stále dominuje chřipka jako taková (33%), hned za ní jsou svou četností lidské rhinoviry (15%) a koronaviry (5%) – viz graf. č. 1. Poukazujeme na poměrně velmi nízkou incidenci nechřipkových virů vyjma HRVa HCoV. Jarní období může samozřejmě tento poměr změnit, ale zdá se, že v letošní sezóně bude především incidence RSV nízká.



V 8. kalendářním týdnu je **nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1 954 nemocných na 100 000 obyvatel**, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 0,5 %. Nejvyšší nárůst nemocnosti (ale jen o 2,4 %) je evidován u dětí ve věku 6-14 let. Nejvyšší nemocnost je aktuálně evidována v kraji Libereckém, Moravskoslezském, Pardubickém, na Vysočině, v Jihočeském, Plzeňském a Jihomoravském kraji, ve všech uvedených krajích počty nemocných přesahují hodnotu 2000/100 000. Nemocnost nadále stoupá v osmi krajích, v šesti krajích klesá.

V kategorii ILI, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byť výrazně podhodnocuje skutečnou nemocnost chřipkou, je v aktuálním týdnu hlášeno 359 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje stejnou nemocnost jako v minulém týdnu.

V aktuální chřipkové sezóně bylo do 23. 2. 2018 hlášeno celkem **199 klinicky závažných případů chřipky** vyžadujících intenzivní péči, z nichž v **50 případech došlo k úmrtí** (43 pacientů ve věkové

skupině 60+, 7 pacientů ve věkové skupině 25-59 let). Z uvedeného počtu nemocných se jednalo v 92 případech o ženy a ve 106 případech o muže.

Závěr: ČR je nadále ve fázi plošné epidemie. Domníváme se, že v aktuálním týdnu bylo dosaženo maxima nemocnosti. Před sebou máme několikátýdenní konsolidaci epidemické vlny. Etiologie chřipkových infekcí je dosud smíšená, laboratorně jsou diagnostikovány oba typy chřipkového viru, typ B jednoznačně převažuje u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. U typu A se výrazněji uplatňuje subtyp A/H1N1.

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ
MUDr. Jan Kynčl, odd. infekční epidemiologie, SZÚ