

**Situace v ČR:**

V Národní referenční laboratoři je evidován pokles detekcí viru chřipky A i chřipky jako takové, velmi mírně narůstá počet detekcí viru chřipky B.

V osmém kalendářním týdnu (KT) bylo v laboratořích spolupracujících s NRL včetně vyšetřeno 923 materiálů na chřipku a virové respirační patogeny, pozitivních detekcí bylo 393. Chřipka typu A byla určena ve 142 vyšetřených materiálech (15, 4 %), ve 30 případech byl určen subtyp A/H1N1 pdm (3,3 %), v 86 materiálech byl detekován subtyp A/H3N2 (9,3 %). Virus chřipky typu B byl detekován ve 24 případech (2,6 %). Z dalších patogenů se nejvíce uplatňují paramyxoviry - respirační syncytiální virus (33 detekcí, 3,6%), metapneumovirus (22 detekcí, 2,4 %) a rinoviry (21 detekcí, 2,3 %).

V 8. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1422 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje pokles o 11,2 %. K poklesu nemocnosti dochází u osob ve všech věkových skupinách. Mezi jednotlivými regiony nejsou významné rozdíly, nejvyšší nemocnost je aktuálně v kraji Libereckém, Karlovarském a Plzeňském.


V kategorii ILI, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byť výrazně podhodnocuje skutečnou nemocnost chřipkou, je v aktuálním týdnu nemocnost stále ještě vysoká, je hlášeno 141 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 32,5 % v porovnání s minulým týdnem. Nemocnost se snižuje ve všech věkových skupinách.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 21. 2. 2020 hlášeno celkem 228 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 44 osob infekci podlehl.

**Situace v Evropě:**

V regionu byl vrchol epidemie dosažen okolo 5. kalendářního týdne. Přesto v některých zemích epidemie chřipky zřejmě vrcholí, Slovinsko hlásí velmi vysokou aktivitu, Lucembursko, Rumunsko, Bosna – Hercegovina, Kosovo Severní Makedonie, Albánie a Arménie hlásí aktivitu vysokou. Zbylé členské země však hlásí aktivitu střední až nízkou. Prakticky v celém regionu přetrvává plošné rozšíření (obrázek č. 1 a, b).

Obr. č.1: Intenzita a geografické rozšíření chřipky

**Závěr:**

I přes pokles nemocnosti v České republice ještě stále přetrvává, i když již slábnoucí, chřipková epidemie.

Zdroj: [www.flunewseurope.org](http://www.flunewseurope.org)

RNDr. Helena Jiřincová

MUDr. Jan Kynčl, PhD