

Evropa: v 15.KT je plošná epidemie ještě evidována v Německu, Chorvatsku, Švédsku, Slovinsku a v některých částech Velké Británie. Ve všech vyšetřených sentinelových vzorcích v rámci EU byla záchytnost chřipky 20,9 %. Předpokládáme, že tato hodnota bude ještě dále klesat až na zcela neepidemickou úroveň v průměru okolo 5 %.

V Evropě je víceméně vyrovnán poměr mezi subtypu A/H1 a H3, ačkoliv A/H1 mírně převažuje. Podíl chřipky B v letošní epidemii byl zcela okrajový.

Česká republika: v 16. kalendářním týdnu je **nemocnost akutních respiračních infekcí** na sezónní úrovni – celkem dosahuje 685 nemocných s ARI na 100 000 obyvatel, oproti předcházejícímu týdnu je to pokles o 16 %. K významnému poklesu došlo i v kategorii ILI . Doposud bylo hlášeno 618 těžkých případů chřipkové infekce, z toho pak 191 úmrtí.

Závěr: v ČR je evidovány pouze sporadické případy chřipkové infekce.

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ

MUDr. Jan Kynčl, odd. epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ